

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

DESITIN - Salbe

Wirkstoffe: Lebertran, Zinkoxid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 8 – 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist DESITIN-SALBE und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von DESITIN-SALBE beachten?
3. Wie ist DESITIN-SALBE anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist DESITIN-SALBE aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST DESITIN-SALBE UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Desitin-Salbe ist eine seit langem verwendete Wund- und Heilsalbe. Der enthaltene Lebertran ist reich an Vitamin A und ungesättigten Fettsäuren und bewirkt somit eine Anregung der Gewebsneubildung. Zinkoxid besitzt desinfizierende und aufsaugende Eigenschaften.

Anwendungsgebiete:

Durch langes Liegen hervorgerufene Druckgeschwüre, Unterschenkelgeschwüre ("offene Beine"), kleinere Schürf- und Schnittwunden, leichte Verbrennungen (auch Sonnenbrand und Gletscherbrand).

In der Säuglings- und Kleinkindpflege zur Vorbeugung und Behandlung des Wundseins, sowie bei Rötungen und entzündlichen Hautveränderungen durch feuchte Windeln.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON DESITIN-SALBE BEACHTEN?

DESITIN-SALBE darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Zinkoxid, Lebertran oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von Desitin-Salbe sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Der Kontakt mit Augen und Schleimhäuten ist zu vermeiden.

Falls eine Entzündung der Wunde auftritt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Anwendung von DESITIN-SALBE zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Die gleichzeitige Anwendung von Desitin-Salbe und anderen äußerlich anzuwendenden Arzneimitteln (wie Antibiotika-, Dithranol- oder Salicylsäurehaltige Arzneimittel) auf den selben Hautstellen kann deren Wirkung beeinträchtigen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Desitin-Salbe kann während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Jedoch sollte eine großflächige Anwendung vermieden werden.

Während der Stillzeit sollte Desitin-Salbe nicht an der Brust aufgetragen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

DESITIN-SALBE enthält Wollwachs (Lanolin) und Cetylstearylalkohol

Wollwachs und Cetylstearylalkohol können örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. WIE IST DESITIN-SALBE ANZUWENDEN?

Dosierung

Desitin-Salbe mehrmals täglich auf die Wunde auftragen.

Art der Anwendung

Desitin-Salbe messerrückendick auf den Verbandstoff auftragen und auf die zu behandelnde Wundfläche auflegen. Die Wundränder sollen fingerbreit überdeckt sein.

Bei geringfügigen Verletzungen kann die Salbe direkt auf die Wunde aufgetragen werden. Salbenreste in der Umgebung der Wunde können mit Wundbenzin oder reinem Pflanzenöl entfernt werden.

Wenn Sie eine größere Menge von DESITIN-SALBE angewendet haben, als Sie sollten

Es wurden bisher keine Fälle von Überdosierung berichtet.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen..

Desitin-Salbe wird gut vertragen.

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle):

Unverträglichkeitserscheinungen mit Hautausschlag. In solchen Fällen soll Desitin-Salbe nicht weiter verwendet werden.

Ohne Angabe der Häufigkeit wurde über folgende Nebenwirkungen berichtet:

Vorübergehende Veränderung der Hautfarbstoffe durch Zinkoxid.

Vorübergehende Hautschuppungen bei länger dauernder Anwendung durch das in Lebertran enthaltene Vitamin A.

Lokale Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) durch einige Bestandteile von Desitin-Salbe (Wollwachs, Cetylstearylalkohol) sind möglich.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST DESITIN-SALBE AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25 °C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. INHALT DER PACLUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was DESITIN-SALBE enthält:

Die Wirkstoffe pro 100 g Salbe sind:

Lebertran	13 g
Zinkoxid	30 g

Die sonstigen Bestandteile sind: Vaseline weiß, Paraffinum solidum, Eucerin, Adeps Lanae anhydr., Talcum, Methylsalicylat und gereinigtes Wasser.

Wie DESITIN-SALBE aussieht und Inhalt der Packung

Nahezu weiße bis ganz schwach gelbe Salbe mit leichtem Geruch nach Lebertran.

Packungen mit 20 g, 50 g.

Pharmazeutischer Unternehmer

SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH

Leystraße 129

A-1200 Wien

Hersteller

MoNo chem-pharm Produkte GmbH

Leystraße 129

A-1200 Wien

Zulassungsnummer

2.111

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2014.