

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

### **Herposicc- Lippensalbe** Wirkstoffe: Benzocain, Zinkoxyd

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Herposicc und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Herposicc beachten?
3. Wie ist Herposicc anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Herposicc aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### **1. WAS IST HERPOSICC UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Herposicc ist eine Lippensalbe mit leicht schmerzlindernder Wirkung.

Herposicc wird für die lokale symptomatische Behandlung von Herpes labialis (Fieberblasen) angewendet.

Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON HERPOSICC BEACHTEN?**

#### **Herposicc darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Benzocain, Zinkoxyd oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Säuglingen und Kleinkindern bis 2 Jahren.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Herposicc anwenden.

Es wird empfohlen, sich nicht übermäßig dem Sonnenlicht auszusetzen und Bestrahlungen mit UV-Licht (Höhensonne, Solarium) zu vermeiden.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen!

### **Kinder und Jugendliche**

Zur Sicherheit und Wirksamkeit von Herposicc bei Säuglingen und Kindern bis 2 Jahren liegen keine Daten vor. Herposicc darf bei Säuglingen und Kleinkindern bis 2 Jahren nicht angewendet werden.

### **Anwendung von Herposicc zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bezüglich Zeugungs-/Gebärfähigkeit sowie Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine Erfahrungen vor, die Anwendung von Herposicc Lippensalbe kann daher nicht empfohlen werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Herposicc enthält Stearylalkohol, Cetylalkohol und Wollwachs**

Stearylalkohol, Cetylalkohol und Wollwachs können örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

## **3. WIE IST HERPOSICC ANZUWENDEN?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zur Anwendung auf der Haut (nur auf den Lippen).

Bei Bedarf eine etwa linsengroße Menge an Salbe mehrmals täglich dünn auf die Lippen auftragen. Die Salbe ist möglichst frühzeitig aufzutragen. Die Dauer der Anwendung richtet sich nach der Dauer der Erkrankung.

### **Wenn Sie eine größere Menge von Herposicc angewendet haben, als Sie sollten**

Bei Anwendung großer Mengen von Herposicc informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

---

*Hinweis für das medizinische Fachpersonal: Informationen zur Behandlung einer Überdosierung finden Sie am Ende dieser Gebrauchsinformation.*

---

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Die Nebenwirkungen sind nach Körpersystemen und ihrer Häufigkeit gemäß folgender Einteilung geordnet:

Sehr häufig	betrifft mehr als 1 Behandelten von 10
Häufig	betrifft 1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich	betrifft 1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten	betrifft 1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten	betrifft weniger als 1 Behandelten von 10.000
Nicht bekannt	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

##### ***Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems:***

Aus Literaturfallberichten ist bekannt, dass die Anwendung von Benzocain an Schleimhäuten in sehr seltenen Fällen zu Methämoglobinämie führen kann. Ein erhöhter Methämoglobinanteil im Blut führt zu Sauerstoffmangel und bläuroter Verfärbung der Haut.

##### ***Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes:***

In seltenen Fällen kann es zu lokalen Reizerscheinungen kommen.

#### 5. WIE IST HERPOSICC AUFZUBEWAHREN?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

##### **Was Herposicc enthält**

- Die Wirkstoffe sind: Benzocain und Zinkoxyd  
1 g Salbe enthält 14 mg Benzocain und 36 mg Zinkoxyd.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Talkum, Schwefel zum äußerlichen Gebrauch, verflüssigtes Phenol, Adeps lanae (Wollwachs), Eucerinum anhydricum (Stearylalkohol, weißes Vaseline, Wollwachsalkohole, Cetylalkohol), Vaselinum flavum.

##### **Wie Herposicc aussieht und Inhalt der Packung**

Herposicc ist eine hellgelbe, homogene Salbe erhältlich in Aluminiumtuben mit Schraubverschluss zu 8 g.

##### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

###### ***Pharmazeutischer Unternehmer:***

Pharmaselect Handels GmbH, 1020 Wien

**Hersteller:**

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, 1020 Wien

**Z. Nr.:** 6.309

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2013.**

---

*Die folgenden Informationen sind für medizinisches Fachpersonal bestimmt:*

**Behandlung einer Überdosierung:**

Bei einer Methämoglobinämie sollten dem Patienten 1 mg Methylenblau/kg Körpergewicht intravenös verabreicht werden.