

**GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER****Neo-Angin – Pastillen**

2,4-Dichlorbenzylalkohol, 6-Pentyl-m-cresol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Neo-Angin – Pastillen jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 3-4 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Neo-Angin – Pastillen und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Neo-Angin – Pastillen beachten?
3. Wie ist Neo-Angin – Pastillen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Neo-Angin – Pastillen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

**1. WAS IST NEO-ANGIN – PASTILLEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Neo-Angin – Pastillen sind Lutschtabletten zur Anwendung bei Halsschmerzen, Rachenkatarrh, Heiserkeit, Erkältungen, Angina, Entzündungen des Mund- und Rachenraumes (Pharyngitis) sowie Entzündungen des Zahnfleisches.

**2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON NEO-ANGIN – PASTILLEN BEACHTEN?****Neo-Angin – Pastillen darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen 2,4-Dichlorbenzylalkohol, 6-Pentyl-m-cresol oder einen der sonstigen Bestandteile von Neo-Angin – Pastillen sind..
- bei erblich bedingter Fructose-Intoleranz, Glucose-Galactose-Malabsorption oder Saccharase-Isomaltase-Mangel,
- wenn Sie an Asthma bronchiale oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen leiden, wegen des Gehaltes an Pfefferminzöl und Menthol. Die Inhalation von Pfefferminzöl und Menthol kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.
- bei Kindern bis zu 6 Jahren.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Neo-Angin – Pastillen ist erforderlich,**

Cochenille Rot, E 124 kann allergische Reaktionen auslösen.

Der häufige und dauernde Gebrauch von Neo-Angin- Pastillen kann schädlich für die Zähne sein (Karies).

Wenn Sie zuckerkrank sind, beachten Sie bitte, dass 1 Pastille 1,14 g Glucose und 1,42 g Saccharose (Zucker) entsprechend ca. 0,22 Broteinheiten (BE) enthält.

**Bei Einnahme von Neo-Angin – Pastillen mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Einnahme von Neo-Angin – Pastillen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Nicht zutreffend.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Obwohl tierexperimentelle Studien nicht auf direkte oder indirekte schädliche Auswirkungen auf Schwangerschaft, embryonale/fetale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung schließen lassen, wird, da keine klinischen Studien über die Anwendung in der Schwangerschaft und in der Stillzeit durchgeführt wurden, die Anwendung von Neo-Angin – Pastillen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Nicht zutreffend.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Neo-Angin – Pastillen**

Nicht zutreffend.

**3. WIE IST NEO-ANGIN – PASTILLEN EINZUNEHMEN?**

Soweit nicht anders verordnet, lassen Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren alle 2-3 Stunden 1 Pastillen langsam im Mund zergehen (maximal 6 Pastillen pro 24 Stunden).

Neo-Angin - Pastillen sollten ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3-4 Tage angewendet werden.

**Wenn Sie eine größere Menge von Neo-Angin – Pastillen eingenommen haben, als Sie sollten**  
Sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

**Wenn Sie die Einnahme von Neo-Angin – Pastillen vergessen haben**

Nehmen Sie keinesfalls die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme wie gewohnt fort.

**Wenn Sie die Einnahme von Neo-Angin – Pastillen vorzeitig abbrechen,**

sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker über die Gründe dafür.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Neo-Angin – Pastillen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:  $\geq 10\%$  ( $\geq 1/10$ )

Häufig:  $\geq 1\%$  –  $< 10\%$  ( $\geq 1/100$  –  $< 1/10$ )

Gelegentlich:  $\geq 0,1\%$  –  $< 1\%$  ( $\geq 1/1.000$ ,  $< 1/100$ )

Selten:  $\geq 0,01\%$  –  $< 0,1\%$  ( $\geq 1/10.000$ ,  $< 1/1.000$ )

Sehr selten:  $< 0,01\%$  ( $< 1/10.000$ ) bzw. Häufigkeit nicht bekannt, da auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Sehr selten können Magenbeschwerden auftreten.

Sehr selten kann es zu Schleimhautreizungen kommen.

Sehr selten sind Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber einem der Inhaltsstoffe möglich.

Pfefferminzöl und Menthol können bei Säuglingen und Kindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen. Die Anwendung ist in dieser Altersgruppe nicht vorgesehen.

Allergische Reaktionen sind nicht auszuschließen.

## 5. WIE IST NEO-ANGIN – PASTILLEN AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was Neo-Angin – Pastillen enthält

- Die Wirkstoffe sind:  
2,4-Dichlorbenzylalkohol, 6-Pentyl-m-cresol
  
- Die sonstigen Bestandteile sind:  
Glucosesirup, Trockensubstanz                    1,1 g pro Pastille  
Saccharose    1,4 g pro Pastille  
Aetheroleum Anisi  
Aetheroleum Menthae piperitae  
Menthol  
Weinsäure  
Cochinille Rot, E 124

### Wie Neo-Angin – Pastillen aussieht und Inhalt der Packung

Runde, rote, leicht bikonvexe, schwach transparente Pastille in einer Aluminiumblisterpackung aus PVC/PVDC zu 24 und 48 Stück.

### Pharmazeutischer Unternehmer

Zulassungsinhaber

M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH, Doerenkampgasse 11, A 1100 Wien

Tel.: +43 1 688 21 61

Fax: +43 1 688 21 61 27

Email: office@klosterfrau.at

**Hersteller**

Klosterfrau Berlin GmbH, D 12274 Berlin

**Z.Nr.:** 13.315

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im  
Februar 2008**