

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **Acerbine Salbe**

Wirkstoffe: DL-Äpfelsäure, Benzoessäure, Salicylsäure

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihren Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist *Acerbine Salbe* und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Acerbine Salbe* beachten?
3. Wie ist *Acerbine Salbe* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Acerbine Salbe* aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist *Acerbine Salbe* und wofür wird sie angewendet?**

Salbe zur Behandlung von oberflächlichen Hautverletzungen, wie zum Beispiel Verbrennungen, Verbrühungen, Sonnenbrand, Wunden, Abschürfungen.

#### **Wirkungsweise**

*Acerbine Salbe* wirkt desinfizierend, schmerzlindernd und beschleunigt die Wundheilung. Sie begünstigt die Ablösung von abgestorbenem Gewebe von der Wundoberfläche und fördert gleichzeitig die Bildung von neuem, gesundem Gewebe. Durch die spezielle Zusammensetzung wirkt die Spezialität antiseptisch, das Wassergleichgewicht wird gesichert und der Heilungsprozess in vielfältiger Weise begünstigt.

*Acerbine Salbe* lässt sich leicht verstreichen. Die Salbengrundlage enthält einen niederen Fettanteil und eignet sich vor allem zur Behandlung von nässenden Wunden, unbedeckten Körperstellen (z.B. Gesicht) und behaarten Körperteilen.

Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Acerbine Salbe* beachten?**

***Acerbine Salbe* darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Äpfelsäure, Benzoessäure, Salicylsäure oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Apotheker bevor sie *Acerbine Salbe* anwenden.

- Wenn Sie großflächige Wunden und Verbrennungen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Falls Sie ein Geschwür haben, an einem Dekubitalgeschwür (Geschwüre durch Druckeinwirkung, bei Bettlägerigkeit) leiden oder auf eine Haut-Transplantation vorbereitet werden, müssen Sie einen Arzt konsultieren.
- Bei schwerer Störung der Nierenfunktion darf *Acerbine Salbe* nicht großflächig und länger angewendet werden.

*Acerbine Salbe* darf nicht mit den Schleimhäuten, insbesondere im Bereich der Augen und dem Mund in Kontakt kommen; waschen Sie sich nach der Anwendung die Hände.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird *Acerbine Salbe* gut vertragen; einzelne Inhaltsstoffe können Reizungen auf der Haut hervorrufen (Benzoessäure, Propylenglykol).

Bei Fortbestand der Beschwerden, unklaren Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

### **Kinder (und Jugendliche)**

*Acerbine Salbe* wird nicht empfohlen für die Anwendung bei Neugeborenen.

### **Anwendung von *Acerbine Salbe* zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihren Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden kürzlich eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Wechselwirkungen wurden bisher nicht beobachtet.

Salicylsäure kann die Aufnahme anderer, an gleicher Stelle aufgetragener Arzneimittel verstärken.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Anwendung von *Acerbine Salbe* in der Schwangerschaft und Stillzeit ist prinzipiell möglich, jedoch darf *Acerbine Salbe* nur kleinflächig angewendet werden.

Während der Stillzeit darf *Acerbine Salbe* im Brustbereich nicht aufgetragen werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

*Acerbine Salbe* hat keinen oder vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

## **3. WIE IST ACERBINE SALBE ANZUWENDEN?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

### **Anwendung bei Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen**

*Acerbine Salbe* mehrmals täglich auf die Wunde oder geschädigte Haut auftragen.

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem Fortschritt des Wundheilungsprozesses.

**Wenn Sie eine größere Menge von *Acerbine Salbe* angewendet haben, als Sie sollten**

Bisher wurden keine Fälle von Überdosierung mit *Acerbine Salbe* berichtet.

Wenn bei großflächiger Anwendung zu große Mengen *Acerbine Salbe* über einen längeren Zeitraum aufgetragen werden, kann es, besonders bei Kindern, durch Aufnahme von Salicylsäure in den Organismus zu milden Vergiftungserscheinungen kommen. Anzeichen sind Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerz, Ohrgeräusche, Schweißausbrüche und Verwirrtheit. Durch Dosierungsverringering werden diese Symptome vermieden. Salicylsäure in höherer Dosierung kann Mikroblutungen verursachen und die Blutungszeit verlängern.

**Wenn Sie die Anwendung von *Acerbine Salbe* vergessen haben**

Tragen Sie weiter die gewohnte Menge der Spezialität auf, ohne die Dosis zu erhöhen.

**Wenn Sie die Anwendung von *Acerbine Salbe* abbrechen**

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie an Ihren Arzt oder Ihren Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen können in folgenden Häufigkeitenn auftreten:

- Sehr häufig ( $\geq 1/10$ )
- Häufig ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ )
- Gelegentlich ( $\geq 1/1.000$ ,  $< 1/100$ )
- Selten ( $\geq 1/10.000$ ,  $< 1/1.000$ )
- Sehr selten ( $< 1/10.000$ )
- Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Es können folgende Nebenwirkungen auftreten:

**Erkrankungen des Immunsystems**

*Sehr selten* kann es zu einer vorher nicht bekannten allergischen Überempfindlichkeitsreaktion (Kontaktsensibilisierung) gegenüber Salicylsäure kommen.

**Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort**

*Häufig* kann *Acerbine Salbe* nach dem Auftragen zu einem vorübergehenden Wärmegefühl führen, anschließend empfindet der Patient eine rasche, anhaltende Schmerzlinderung.

*Selten* treten unmittelbar um den behandelten Wundbereich leichte Hautrötung und urtikarieller Hautausschlag des gesunden Gewebes auf.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5  
AT-1200 WIEN

MONTAVIT Ges.m.b.H.

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist *Acerbine Salbe* aufzubewahren?**

Für diese Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Nach erstmaliger Öffnung innerhalb von 6 Monaten verwenden.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach *<verwendbar bis>* angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was *Acerbine Salbe* enthält**

- Die Wirkstoffe sind: DL-Äpfelsäure, Salicylsäure, Benzoesäure.  
1 g enthält 7,0 mg DL-Äpfelsäure, 0,5 mg Benzoesäure und 0,133 mg Salicylsäure.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Propylenglykol, Xalifin und gereinigtes Wasser.

### **Wie *Acerbine Salbe* aussieht und Inhalt der Packung**

Weißer Salbe in Tuben zu 30 g und 100 g Inhalt im Faltkarton.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutische Fabrik MONTAVIT Ges.m.b.H.

6067 Absam, Austria

Tel.: +43 0 5223 57926 0

Fax: +43 0 5223 57926 11

E-Mail: [pharma@montavit.com](mailto:pharma@montavit.com)

**Z.Nr.** 16.169

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2014.**