

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **WICK VapoRub Salbe**

Wirkstoffe: Levomenthol, Campher, Eucalyptusöl, Terpentinöl

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist WICK VapoRub Salbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von WICK VapoRub Salbe beachten?
3. Wie ist WICK VapoRub Salbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist WICK VapoRub Salbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Wick VapoRub Salbe und wofür wird sie angewendet?**

WICK VapoRub Salbe ist ein pflanzliches Arzneimittel zur äußerlichen Anwendung bei Erkältungskrankheiten der oberen Atemwege wie Schnupfen, Heiserkeit und Husten.

WICK VapoRub Salbe wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 2 Jahren.

Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Wick VapoRub Salbe beachten?**

##### **WICK VapoRub Salbe darf nicht angewendet werden**

- wenn Sie allergisch gegen einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von WICK VapoRub Salbe kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.
- bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).

##### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie WICK VapoRub anwenden.

Nur äußerlich anwenden. Nicht schlucken! Nicht im Gesicht anwenden. Kontakt mit Augen, Nase und Mund vermeiden. Nach der Anwendung der Salbe ist eine gründliche Reinigung der Hände erforderlich.

Die Anwendung auf Schleimhäuten, vorgeschädigter oder entzündeter Haut, offenen Wunden, Verbrennungen oder bei Haut- und Kinderkrankheiten mit Hautausschlag (Exanthem) ist zu vermeiden.

Salbe nicht als festen Verband anlegen und nicht zusammen mit Wärmekissen oder anderer Art von Wärme anwenden.

Bei Auftreten von Atemnot oder eitrigem/blutigem Husten- oder Nasenschleim ist ein Arzt zu kontaktieren.

Kinder und Jugendliche:

Bei Säuglingen und Kindern unter 2 Jahren darf dieses Arzneimittel nicht angewendet werden (siehe Abschnitt „WICK VapoRub Salbe darf nicht angewendet werden“).

### **Anwendung von WICK VapoRub Salbe zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

WICK VapoRub darf während der Stillzeit nicht im Bereich der Brust der stillenden Mutter angewendet werden, da das Risiko eines Kehlkopfkrampfes beim Kind während des Trinkens nicht ausgeschlossen werden kann.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Zur Auswirkung auf die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu lenken oder Maschinen zu bedienen, wurden keine entsprechenden Untersuchungen durchgeführt.

## **3. Wie ist Wick VapoRub Salbe anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche: Eine 2 bis 3 teelöffelgroße Menge 2-4mal täglich

Kinder ab zwei Jahren: ½ - 1 teelöffelgroße Menge 2-4mal täglich

Kinder unter 2 Jahren

Bei Säuglingen und Kindern unter 2 Jahren darf dieses Arzneimittel nicht angewendet werden.

Art der Anwendung

Nur äußerlich anwenden. Auf Brust, Hals und Rücken auftragen und leicht massierend einreiben. Nach der Anwendung der Salbe ist eine gründliche Reinigung der Hände erforderlich.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Wenn Sie eine größere Menge angewendet haben, als Sie sollten**

Eine Überdosierung kann zu Hautreaktionen führen.

Bei Fehlanwendungen (Nichtbeachtung der Anwendungshinweise oder Dosierungsanleitung) die Salbe mit speiseölgetränkten Papiertüchern oder Baby-Öltüchern entfernen. Falls infolge einer Fehlanwendung irgendwelche Beschwerden auftreten, ist sofort Kontakt mit einem Arzt aufzunehmen.

Falls ein Kind versehentlich WICK VapoRub Salbe verschluckt, ist es wichtig unverzüglich einen Arzt aufzusuchen, der/die die notwendige Behandlung durchführen kann. Versuchen Sie nicht, Erbrechen herbeizuführen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

*Die Häufigkeit des Auftretens der folgenden Nebenwirkungen ist nicht bekannt:*

- allergische Reaktionen der Haut wie Rötung, Reizung oder eine Kontaktallergie (z.B. Kontaktekzeme)
- Kurzatmigkeit oder Hustenreiz nach Inhalation
- WICK VapoRub Salbe kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

AT-1200 WIEN

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist Wick VapoRub Salbe aufzubewahren?**

Nicht über 25°C lagern. Behältnis nach Gebrauch fest verschließen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett / Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### **Was WICK VapoRub Salbe enthält**

Die Wirkstoffe sind:

100 g WICK VapoRub Salbe enthalten: 2,75 g Levomenthol; 5,0 g Campher (razemisch); 1,5 g Eucalyptusöl (Eucalypti aetheroleum); 5,0 g Terpentingöl vom Strandkiefertyp.

Die sonstigen Bestandteile sind: Thymol, ätherisches Wachholderholzöl, weißes Vaseline.

##### **Wie WICK VapoRub Salbe aussieht und Inhalt der Packung**

Weiche, weißliche Salbe mit charakteristischem Geruch nach Campher und Menthol

Kunststoff-Salbentiegel mit 25 g, 50 g und 100 g Inhalt

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

**Pharmazeutischer Unternehmer (Zulassungsinhaber)**

WICK Pharma

Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

D-65823 Schwalbach, Deutschland

„A“: Tel.: 0800-201609

**Hersteller**

Procter & Gamble Manufacturing GmbH, D- 65824, Schwalbach/Ts., Deutschland

**Z. Nr.:** 11.627

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2016.**