

Gebrauchsinformation

Iberogast® Flüssigkeit zum Einnehmen

Zul. Nr. 1-25913

Zusammensetzung

100 ml enthalten arzneilich wirksame Bestandteile:

Alkoholischer Frischpflanzenauszug aus:

Iberis amara (Bittere Schleifenblume) (1:1,5-2,5) 15,0 ml
(Auszugsmittel: 50 Vol.-% Ethanol)

Alkoholische Droгенаuszüge aus:

Angelikawurzel	(1:2,5-3,5)	10,0 ml
Kamillenblüten	(1:2 -4)	20,0 ml
Kümmel	(1:2,5-3,5)	10,0 ml
Mariendistel Früchten	(1:2,5-3,5)	10,0 ml
Melissenblättern	(1:2,5-3,5)	10,0 ml
Pfefferminzblättern	(1:2,5-3,5)	5,0 ml
Schöllkraut	(1:2,5-3,5)	10,0 ml
Süßholzwurzel	(1:2,5-3,5)	10,0 ml

(Auszugsmittel für alle Drogen: 30 Vol.-% Ethanol)

Das Arzneimittel enthält 31 Vol.-% Alkohol.

1 ml entspricht 20 Tropfen.

Arzneiform und Packungsgrößen

Flüssigkeit zum Einnehmen

Iberogast® ist eine dunkelbraune, klare bis leicht trübe Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch.

Packungen zu 20 ml, 50 ml und 100 ml

Eigenschaften und Wirkungsweise

Pflanzliches Arzneimittel mit krampflösender und beweglichkeitsregulierender Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt.

Zulassungsinhaber und Hersteller

Zulassungsinhaber

Bayer Austria Ges.m.b.H. 1160 Wien

Hersteller

STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH
Havelstraße 5
64295 Darmstadt
Deutschland

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von funktionellen und beweglichkeitsbedingten Magen-Darm-Erkrankungen, wie Reizmagen- und Reizdarmsyndrom (einschließlich Magen- und Darmkrämpfe), sowie zur unterstützenden symptomatischen Behandlung bei Gastritis.

Gegenanzeigen

Iberogast® darf nicht bei Überempfindlichkeit gegenüber einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile eingenommen werden.

Für die Anwendung von Iberogast bei Kindern unter 3 Jahren liegen keine ausreichenden Daten vor.

Bei Kindern unter 3 Jahren darf Iberogast® wegen des Alkoholgehalts nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichenden Daten vorliegen und wegen des Alkoholgehalts wird die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Dieses Arzneimittel enthält 31 Vol.-% Alkohol. Das sind bis zu 240 mg pro Einzeldosis von 20 Tropfen, entsprechend 6,2 ml Bier oder 2,6 ml Wein. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern.

Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder nach 10 Tagen keine Besserung eintritt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Die Anwendung bei Kindern von 3 bis 6 Jahren darf nur nach ärztlicher Empfehlung erfolgen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, wird Iberogast® 3mal täglich vor oder zu den Mahlzeiten in etwas Flüssigkeit eingenommen.

Erwachsene und Jugendliche nehmen 20 Tropfen, Kinder von 6 bis 12 Jahren nehmen 15 Tropfen und Kinder von 3 bis 6 Jahren nehmen 10 Tropfen ein.

Die Anwendung bei Kindern von 3 bis 6 Jahren darf nur nach ärztlicher Empfehlung erfolgen.

Wegen des Alkoholgehalts darf Iberogast bei Kindern unter 3 Jahren nicht angewendet werden.

Vor Gebrauch schütteln!

Nebenwirkungen

Sehr selten (betrifft weniger als 1 Behandelten von 10.000) können Überempfindlichkeitsreaktionen wie z.B. Hautausschlag, Juckreiz, Atembeschwerden auftreten.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden.

Falls Nebenwirkungen auftreten, die nicht in der Gebrauchsinformation angeführt sind, melden Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Inst. Pharmakovigilanz

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit und Lagerung des Arzneimittels

Iberogast® nicht über 25 °C lagern! Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren. Die Braunglasflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Sollte Iberogast® Ausflockungen oder Trübungen aufweisen, so sind diese ohne Einfluß auf die Wirksamkeit des Präparates.

Iberogast® darf nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.
Nach Anbruch des Behältnisses ist Iberogast® 8 Wochen haltbar.

Stand der Information

April 2015

Bei Unklarheiten fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.