Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Prostasan-Kapseln

Wirkstoff: Extrakt aus Früchten der Sägepalme

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 4 – 8 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Prostasan-Kapseln und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Prostasan-Kapseln beachten?
3. Wie sind Prostasan-Kapseln einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Prostasan-Kapseln aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Prostasan-Kapseln und wofür werden sie angewendet?

Prostasan-Kapseln werden zur unterstützenden Therapie von leichten Beschwerden beim Harnlassen bei **Männern**, wie häufiger Harndrang während des Tages oder Nachts, Abschwächung des Harnstrahls oder Nachträufeln des Harns angewandt.

Wenn Sie sich nach 4 – 8 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Prostasan-Kapseln beachten?

Prostasan-Kapseln dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Früchte der Sägepalme oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- von Frauen, Kindern und Jugendlichen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Prostasan-Kapseln einnehmen.

Bei Fortbestand der Beschwerden, oder wenn der erwartete Erfolg durch die Behandlung nicht eintritt, ist ehestens ärztliche Beratung erforderlich.

Einnahme von Prostasan-Kapseln zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Aufgrund des Anwendungsgebietes nicht zutreffend.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Prostasan-Kapseln haben keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Prostasan-Kapseln enthalten Sorbitol.

Bitte nehmen Sie Prostasan-Kapseln erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie sind Prostasan-Kapseln einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene Männer:

1mal täglich 1 Kapsel.

Nach dem Essen, unzerkaut mit etwas Wasser einnehmen.

Ein Behandlungszyklus dauert je nach Schwere der Beschwerden 4 bis 8 Wochen. Die Abnahme der Beschwerden ist von der Dauer der Einnahme abhängig.

Wenn Sie eine größere Menge von Prostasan-Kapseln eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich einmal das Doppelte oder Dreifache der vorgesehenen Menge eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosierte haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt halten.

Wenn Sie die Einnahme von Prostasan-Kapseln vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie die Einnahme wie verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Über folgende Nebenwirkungen wurde berichtet:

Selten (betrifft 1 bis 10 Personen von 10.000):

Übelkeit bei Einnahme auf nüchternen Magen. Durch Einnehmen der Kapsel zu einer Mahlzeit wird dies weitgehend vermieden.

Sehr selten (betrifft weniger als 1 Person von 10.000):

allergische Hautreaktionen (Hautausschlag, Purpura, Ödeme).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5

1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Prostan-Kapseln aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Prostan-Kapseln enthalten

- Der Wirkstoff ist:
Extrakt aus Früchten der Sägepalme
1 Kapsel enthält 320 mg Extrakt aus Früchten der Sägepalme (*Serenoa repens*)
(Droge-Extraktverhältnis 9 – 12:1, Extraktionsmittel Ethanol 96 % V/V)
- Die sonstigen Bestandteile sind:
Kapselhülle: Gelatine, Glycerol, Sorbitol-Lösung 70 %, Eisenoxid gelb, rot und schwarz (E 172) und gereinigtes Wasser.

Wie Prostan-Kapseln aussehen und Inhalt der Packung

Eiförmige, dunkelbraune Weichkapsel in einer Braunglasflasche mit Aluminiumschraubkappe.
Packungsgrößen: 30 Stück, 90 Stück

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

guterrat Gesundheitsprodukte
Eduard-Bodem-Gasse 6
6020 Innsbruck

Hersteller:

Bioforce AG, Grünaustrasse 4, CH-9325 Roggwil, Schweiz

Verantwortlich für die Chargenfreigabe im EWR:

Biohorma B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16, NL-8081 HC Elburg, Niederlande

Zulassungsnummer: 1–26809

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2015.