

**GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER****Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen**

2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
- Wenn Sie sich nach 3-4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was sind Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen beachten?
3. Wie sind Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### **1. WAS SIND NEO-ANGIN ZUCKERFREI – PASTILLEN UND WOFÜR WRDEN SIE ANGEWENDET?**

Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen sind Lutschtabletten zur Anwendung bei Halsschmerzen, Rachenkatarrh, Heiserkeit, Erkältungen, Angina, Entzündungen des Mund- und Rachenraumes (Pharyngitis) sowie Entzündungen des Zahnfleisches.

### **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON NEO-ANGIN ZUCKERFREI – PASTILLEN BEACHTEN?**

**Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile von Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen sind.
- 
- bei Kindern bis zu 6 Jahren.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen einnehmen.

**Anwendung von Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine hinreichenden Daten für die Verwendung von Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen bei Schwangeren und stillenden Müttern vor. Aufgrund fehlender Erfahrung wird die Anwendung von Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Nicht zutreffend.

**Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen enthält Cochenillerot A und Isomalt**

Cochenillerot A, E 124 kann allergische Reaktionen auslösen.

Bitte nehmen Sie Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Isomalt kann ab 10 g täglich (entspricht ca. 4 Pastillen) eine leichte abführende Wirkung haben..

**3. WIE IST NEO-ANGIN ZUCKERFREI – PASTILLEN EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Soweit nicht anders verordnet, lassen Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren alle 2-3 Stunden 1 Pastillen langsam im Mund zergehen (maximal 6 Pastillen pro 24 Stunden).

Neo-Angin zuckerfrei - Pastillen sollten ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3-4 Tage angewendet werden.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen. Zum Lutschen.

**Wenn Sie eine größere Menge von Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen eingenommen haben, als Sie sollten**

Sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

**Wenn Sie die Einnahme von Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen vergessen haben**

Nehmen Sie keinesfalls die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme wie gewohnt fort.

**Wenn Sie die Einnahme von Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen vorzeitig abbrechen,**

sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker über die Gründe dafür.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel können auch Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:  $\geq 10\%$  ( $\geq 1/10$ )

Häufig:  $\geq 1\%$  –  $< 10\%$  ( $\geq 1/100$  –  $< 1/10$ )

Gelegentlich:  $\geq 0,1\%$  –  $< 1\%$  ( $\geq 1/1.000$ ,  $< 1/100$ )

Selten:  $\geq 0,01\%$  –  $< 0,1\%$  ( $\geq 1/10.000$ ,  $< 1/1.000$ )

Sehr selten:  $< 0,01\%$  ( $< 1/10.000$ )

Häufigkeit nicht bekannt, da auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Sehr selten können Magenbeschwerden auftreten.

Sehr selten kann es zu Schleimhautreizungen kommen.

Sehr selten sind Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber einem der Inhaltsstoffe möglich.

Pfefferminzöl und Levomentholenthol können bei Säuglingen und Kindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen. Die Anwendung ist in dieser Altersgruppe nicht vorgesehen.

Allergische Reaktionen sind nicht auszuschließen.

#### **5. WIE SIND NEO-ANGIN ZUCKERFREI – PASTILLEN AUFZUBEWAHREN?**

Nicht über 30°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit und Licht zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel/Blisterpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

### Was Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen enthalten

- Die Wirkstoffe sind:  
2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol

Eine Pastille enthält:

2,4-Dichlorbenzylalkohol	1,2 mg
Levomenthol	5,7 mg
Amylmetacresol	0,6 mg

Die sonstigen Bestandteile sind:

Aetheroleum Anisi stellati  
Aetheroleum Menthae piperitae  
Weinsäure  
Cochenillerot A, E 124  
Isomalt

### Wie Neo-Angin zuckerfrei – Pastillen aussehen und Inhalt der Packung

Runde, rote, leicht bikonvexe, schwach transparente Pastille in einer Aluminiumblisterpackung aus PVC/PVDC zu 24 und 48 Stück.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

#### Zulassungsinhaber

M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH, Doerenkampgasse 11, A 1100 Wien  
Tel.: +43 1 688 21 61  
Fax: +43 1 688 21 61 27  
Email: office@klosterfrau.at

#### Hersteller

Klosterfrau Berlin GmbH, D 12274 Berlin

**Z.Nr.: 1-20474**

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2014**